



USO VETERINÁRIO

M3Ecto

Carrapaticida, Mosquicida, Bernicida, Sarnicida e Piolhicida

Concentrado Emulsionável a base de Cipermetrina, Clorpirifós e Butóxido de Piperonila



FÓRMULA (em 100 mL de produto):

Cipermetrina	7,50 g
Clorpirifós.	12,50 g
Butóxido de piperonila	30,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

M3Ecto é indicado para bovinos como carrapaticida (*Boophilus microplus*), como bernicida (*Dermatobia hominis*), como mosquicida e repelente da mosca-do-chifre (*Haematobia irritans*), da mosca doméstica (*Musca domestica*) e da *Stomoxys calcitrans* além de atuar como repelente das moscas adultas vetoras do berne, auxiliando no controle preventivo das infestações por berne bovino. M3Ecto está indicado ainda no controle de piolhos hematófagos (*Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus* e *Haematopinus sp*) e piolhos mastigadores - malofago (*Damalinea bovis*) e sarnas: demodéica (*Demodex bovis*), da cabeça (*Sarcoptes scabiei*), do corpo (*Psoroptes bovis*) e dos pés (*Chorioptes bovis*).

MODO DE USAR:

As seguintes diluições são indicadas para o produto:

. Banhos de aspersão: Diluir 40 mL do produto em 20 litros de água ou 1 litro do produto em 500 litros de água.

Peso vivo do animal	Volume de calda
100 kg	1 L
200 kg	2 L
300 kg	3 L
400 kg	4 L
500 kg	5 L

. Pulverizar todo o corpo do animal molhando-o muito bem, principalmente as seguintes partes: orelhas, base dos chifres, barbela, axilas, entre membros, virilhas e inserção da cauda.

. Recomenda-se a dosagem de 1 litro de calda para cada 100 kg de peso vivo.

. Utilizar o produto logo após a diluição.

. Uma única aplicação é recomendada por tratamento.

. O intervalo entre doses irá depender do programa proposto pelo médico veterinário da propriedade para o controle dos agentes susceptíveis ao produto. No entanto, o intervalo mínimo recomendado entre as aplicações é de 14 dias.

CONTRA INDICAÇÕES:

. Não aplicar o produto em animais doentes, cansados ou debilitados.

. Não aplicar o produto durante o período mais quente do dia.

. Não aplicar em caso de ameaça de chuva, nem em animais molhados.

. Não aplicar em fêmeas em gestação avançada (últimos 30 dias de gestação).

. Não aplicar em animais com menos de 100 kg de peso vivo.

. Não usar o produto associado com outros produtos organofosforados, carbamatos ou quaisquer inibidores da colinesterase e respeitar intervalo de 14 dias entre as aplicações.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- . Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- . Ler atentamente as instruções.
- . Não comer, não beber, e não fumar durante o manuseio do produto.
- . Conservar o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- . Não utilizar perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e fogo.
- . Não reutilize a embalagem vazia.
- . Recomenda-se enterrar as embalagens vazias longe dos mananciais.
- . Manter a embalagem fechada.
- . Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- . Utilizar luvas impermeáveis, botas plásticas, macacões, óculos e máscaras durante o manuseio do produto.
- . Evitar o contato com a pele e inalação durante a aplicação.
- . Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros.
- . Utilizar água limpa.
- . Não aplicar em touros.

APRESENTAÇÕES: Frascos plásticos contendo 40 mL, 200 mL e 1 litro.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Conservar o frasco sempre fechado, em local seco e fresco, ao abrigo da luz. Este ou qualquer outro medicamento deverá ser mantido em local seguro e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.693 em 29/08/2003.

Resp. Técnico: Oswaldo de Souza Garcia - CRMV-SP 01.225.



Proprietário e Fabricante: Fabiani Saúde Animal Ltda.
R. Centro Africana, 219 - Sto. Amaro - São Paulo/SP
Cep: 04730-050 - C.N.P.J. 15.741.848/0001-49
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800-7731900 - www.fabianisaudeanimal.com.br
sac@fabianisaudeanimal.com.br
Indústria Brasileira